





Medikationsplanung für: Herrn Max Muster geb. 12.01.1954 Zimmer 12

vom 12.10.2020 - 18.10.2020

Dauer-/Beimedikation

							07:00	08:00	09:00	11:00	12:15	13:00	14:00	18:00	22:05		
Dauermedikation	Alendron Hexal 1Xwoe.Tab 70mg HEXAL AG TAB Alendronsäure	Alle 7 Tage 30 Min.vor dem Frühstück mit 200ml Wasser,kein Mineralwasser! im Stehen oder Sitzen nehmen.30 Min.nicht hinglegen,keine Getränke,Speisen o.Medikamente.2h Abstand:Milch, Antacida, Fe-Salze. (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Sa []	HdZ PD Absetz-Datum	1										
						HdZ Arzt HdZ Arzt											
	Ass 100mg Heumann Tabletten HEUMANN PH GMBH&CO. KG TAB Acetylsalicylsäure	90-60Min.nach d.Essen m.1 Gl.Wasser. Nahrung verzögert Resorption,schützt Magen.Cave:Blutungsneig.Asthma,Stillende, Gravide nur m.Arzt,Alkoholblutspiegel steigt um 50%. Kinderdosis nur lt.Arzt! (Soweit nicht anders verordnet)	Mayer Tel.		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD Absetz-Datum	1			1						1	
						HdZ Arzt HdZ Arzt											
	Ass Hexal 500 Tabletten HEXAL AG TAB Acetylsalicylsäure	Mit 1 Gl. Wasser vor o.nach dem.Essen, Wasser beschleunigt, Nahrung verzögert Wirkungseintritt.Stillende u. Schwangere nur m. Arzt.Max.6T./d.Cave:Ulcus,Blutungsneig,Alkohol=>Blutspiegel + 50%. (Soweit nicht anders verordnet)	Muster Tel.		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD Absetz-Datum	1										
						HdZ Arzt HdZ Arzt											
Crataegutt Novo 450 Filmtabl. W.SCHWABE GMBH&CO.KG FTA Crataegus-Glykoside	Alle 12 Std.1 zum Essen 1 m.1 Gl.Wasser, Saft o.Tee.Bes.für Altersherz geeignet Langzeittherapie:maximal 6 Wochen ohne Arzt.Bei:Beinoedemen,Herzschmerzen, Atembeschwerden direkt zum Arzt! (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD Absetz-Datum	1								1			
					HdZ Arzt HdZ Arzt												
Diclofenac Ratio 75 SI Ret.Kps RATIOPHARM GMBH REK Diclofenac	Mit 1 Gl.Wasser im Sitzen oder Stehen nach dem Essen,immer im gleichen Abstand zur Nahrung lt.Arzt nehmen.Einnahme 1/2 Std.vor dem Zubettgehen mindert Morgensteife bei Rheuma.Sonnenbad/-bank meiden (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD Absetz-Datum	2											
					HdZ Arzt HdZ Arzt												
Gabapentin AI Hka 300mg ALIUD PHARMA HKP Gabapentin	Alle 8 Std. zu o. zwischen den Mahlzeiten mit 1 Gl.Wasser. Maxim. Einnahmeabstand 12 Std. Zu Antacida,bes.Mg- und AI-Salzen 2 Std. Abstand,sonst bis 24 % Resorptionsverlust (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD Absetz-Datum	1			1						1		
					HdZ Arzt HdZ Arzt						1						

Dauer-/Beimedikation

							07:00	08:00	09:00	11:00	12:15	13:00	14:00	18:00	22:05		
Dauermedikation	Ibuprofen Heumann Fta 600mg HEUMANN PH GMBH&CO. KG FTA Ibuprofen	Zum Essen m.1 Gl.Wasser.It.Verordnung- Wirkt in 20-40 Min.4-6 h Einnahme vor d. Schlafengehen lindert Morgensteife.Cave: Ulcus,Blutungsneigung,Gravide,Alkohol ASSProphylax.abgeschw.Antacida 2h Abstd. (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD HdZ Arzt	Absetz-Datum HdZ Arzt		1								
	Magnetrans Kapseln Forte HKP Magnesiumoxid	2xtgl.kurz vor dem Essen mit 1 Glas Wasser o.Saft.Zu Fe-Salzen,NaF,Tetracyc- liden 2-3 Std. Abstand halten.Bei plötz- licher Müdigkeit o Durchfällen absetzen! Empf.Tagesdosis 300 mg (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD HdZ Arzt	Absetz-Datum HdZ Arzt		2								1
	Omepr Hexal Kmr 10mg HEXAL AG KMR Omeprazol	Zum Frühstück m.1 Gl.Wasser,ggf.Kaps. ffnen in Joghurt o.ä.Wirkt bes.morgens. Sonne/Solar.meiden.Cave:Johanniskraut,Di- goxin,Azolfungizide.Makrolidantibiotica: 2 Std.Abstand.Empfeh.Vit B12 + Folsäure. (Soweit nicht anders verordnet)	Müller Tel.		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD HdZ Arzt	Absetz-Datum HdZ Arzt		1							1	
	Omeprazol Teva Kmr 40mg GRY- PHARMA GMBH KMR Omeprazol	1 Std.vor d.Frühstück im Sitzen o.Stehen mit 1Gl. Wasser. Wirkt bes. morgens.Son- ne/Solar.meiden.Cave:Johanniskraut,Di- goxin,Azolfungizide. Makrolidantibiotica:2 Std.Abstand.Empfehlg.Vit B12 + Folsäure. (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD HdZ Arzt	Absetz-Datum HdZ Arzt			1							1
	Ramipril Ratio Cp Tab 5/25mg RATIOPHARM GMBH TAB Ramipril und Diuretika	Tagesmenge zum Frühstück mit 1 Glas Wasser.Zu NSAR o. Salcyaten 1 h Abstand Cave:Lakritz in größeren Mengen,Laxanti- en,Kochsalz>5g/Tag,Sonnenbad/-bank,Alko- holtoleranz herabgesetzt! (Soweit nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 040 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HdZ PD HdZ Arzt	Absetz-Datum HdZ Arzt			1							1